Fecha de Actualización
02/Febrero/2010

SHARDIF

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Difenoconazol:cis,trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil eter: **250**gramos por litro de formulación a 20 ºC.

Ingredientes aditivos:c.s.p. 1 litro.

REGISTRO NACIONAL ICA No. 248

Titular del Registro: Anasac

GENERALIDADES

SHARDIF es un fungicida sistémico y de contacto, con una acción preventiva y curativa de larga duración. Experimenta una elevada absorción translaminar, lo cual evita el lavado por acción de la lluvia. Inhibidor de la biosíntesis del ergosterol. Impide significativamente el crecimiento subcuticular del micelio y el desarrollo de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda aplicar **SHARDIF** cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC
Clavel	Mancha anillada: (*Heterosporium echinolatum*)	0.06 a 0.1 cm^3 de p.c. /m^2 solo; ó 0.04 cm^3 de p.c. /m^2 en mezcla con protectante*	NA
Cebolla junca	Amarillera: (*Alternaria porri*)	0.3 –0.5 l/ha. Aplicar preferiblemente cuando la humedad relativa sea alta, con temperaturas entre 21 –30 ºC (ya que estas condiciones favorecen el desarrollo de la enfermedad).	7
Fríjol	Antracnosis: (*Colletotrichum lindemuthianum*), Mancha anillada o mancha de Ascochyta: (*Phoma exigua var. diversispora*)	0.5 l/ha	14
Rosas**	Oídio o mildeo polvoso: (*Sphaerotheca pannosa*).	0.6 cm^3 de p.c. /litro de agua; ó 0.2 – 0.3 cm^3 /litro de agua en mezcla con	NA

		0.2 –0.3 cm^3 /litro de Penconazol 100 EC.	
Tomate	Tizón temprano: (*Alternaria solani*)	0.25 –0.5 l/ha. Aplicar preferiblemente cuando la humedad relativa sea alta, con temperaturas entre 21 –30 ºC (ya que estas condiciones favorecen el desarrollo de la enfermedad).	7
Tomate de árbol *(Solanum betacea)*	Antracnosis: (*Colletotrichum gloesporoides*)	0.25 cm^3 /litro de agua. Aplicar en mezcla con Clorotalonil 720 SC.	

PC: Periodo de carencia: Intervalo de seguridad (días) entre la última aplicación y la cosecha.

NA: No aplica.

*****MANCROP ™ 80 WP (Mancozeb) en dosis de 5.18 kg /ha.

******Aplicar preferiblemente antes de la aparición de los primeros síntomas visibles de la enfermedad. Repetir la aplicación hasta 2 veces más, a intervalos de 7 días.

PERIODO DE REENTRADA AL CULTIVO TRATADO: 12 horas. De ser necesario el ingreso antes de 12 horas, se requiere que la persona emplee los elementos de protección personal.

MODO DE EMPLEO

Para preparar la mezcla (caldo), agregue la cantidad recomendada de **SHARDIF** al volumen requerido de agua y agite brevemente hasta obtener una mezcla homogénea. Los caldos de aspersión deben prepararse solo inmediatamente antes de su aplicación y no deben guardarse para el día siguiente.

COMPATIBILIDAD

SHARDIF es miscible con formulaciones de las mismas características. Se recomienda elaborar una premezcla a pequeña escala para estudiar su compatibilidad con otros productos.

FITOCOMPATIBILIDAD

SHARDIF es fitocompatible con la mayoría de variedades de los cultivos de clavel, rosas, fríjol, tomate y cebolla junca. Sin embargo, debido al gran número de variedades, se recomiendan ensayos de pequeña escala antes de la aplicación (sobretodo en variedades nuevas).

PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.**
- Quite la ropa y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón por 20 minutos.
- Lave inmediatamente los ojos contaminados con agua pura durante 10 a 15 minutos.
- En caso de inhalación, el paciente debe trasladarse a un lugar aireado.
- Si el producto se ha ingerido, enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito.

GUÍA PARA EL MÉDICO

- **Síntomas de intoxicación**: Alteración del sistema nervioso central. Irritación de la mucosa, efecto anestésico, dolor de cabeza, náusea y vértigo. Potencial de irritación dérmica y ocular.
- **Tratamiento:**Seguir tratamiento sintomático.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".
DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA TAL FIN.

En caso de intoxicación, comuníquese con CISPROQUIM:Línea 01 8000 916012 atención 24 horas. O en Bogotá al teléfono (091) 2886012

PRESENTACIONES:120 cc, 250 cc, 1 Lt, 20 Lts.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO